

Para alívio da dor da osteoartrite canina,  

---

**UTILIZE GALLIPRANT™ DESDE OS ESTÁGIOS  
INICIAIS DA OSTEOARTRITE CANINA.**

---

**INDICAÇÃO:**

Galliprant™ é um AINE indicado no tratamento da dor e da inflamação associados à osteoartrite em cães.

Quase  
**75%**  
dos cães

... estão em **ESTÁGIOS MODERADOS** ou **GRAVES DA OA** antes de iniciarem o tratamento!

### Osteoartrite canina precoce não tratada

Como médico veterinário você deseja que seus pacientes portadores da OA continuem fortes e ativos, para que possam brincar e aproveitar a vida com suas famílias, porém, isso pode ser desafiador.

### Controlando a dor da OA canina **DESDE O INÍCIO**

A detecção **PRECOCE** da OA canina é um esforço conjunto

Acesse o QR code abaixo e tenha acesso às ferramentas da Elanco que auxiliarão médicos veterinários e tutores sobre o diagnóstico, estadiamento e monitoramento da OA.



### Aumente suas opções contra a OA canina

Utilize esses recursos confiáveis como parte de um plano de reabilitação multimodal para avaliar e monitorar a OA canina dos seus pacientes ao longo do tempo e manter você no controle da dor e da inflamação da OA.

#### DOR



Desenvolvimento de doenças ou lesões

#### Os sinais de OA podem passar despercebidos

A OA canina pode ter início no animal jovem, devido a uma doença articular ou trauma do desenvolvimento, mas os sinais clínicos iniciais podem ser sutis e difíceis de serem notados pelos donos dos animais de estimação. Isso pode levar a um atraso no tratamento.



#### Envolva os tutores dos animais

Tutores de animais de estimação bem informados podem ficar atentos às alterações comportamentais da OA precocemente – ajudando você a avaliar seus pacientes de OA mais rapidamente.


#### SENSIBILIZAÇÃO



O ciclo da dor continua

#### Dor da OA

A dor não controlada tem consequências psicológicas e fisiológicas adversas. Sem o controle da dor, o ciclo da dor continua com o fenômeno de *wind-up* e a sensibilização contínua.<sup>2, 3, 4</sup>



#### Diagnóstico precoce

A detecção prematura possibilita a oportunidade de intervir e controlar a dor da OA mais cedo no ciclo da doença.

#### ATIVIDADE REDUZIDA



#### Impacto na vida diária

Mais dor leva a menos movimento, perda de massa muscular e redução da força – afetando as atividades cotidianas.



#### Plano de tratamento da OA a longo prazo

Um plano de reabilitação multimodal monitorado dá suporte à força e mobilidade dos seus pacientes e mantém você no controle da dor da OA.

A dor crônica e as alterações físicas avançadas decorrentes da OA podem ser muito difíceis de controlar.

Trate a OA canina prematuramente para que os seus pacientes possam continuar se movimentando e fazendo aquilo que amam.



Estadiamento e Monitoramento<sup>3</sup>.

#### LOAD



Questionário do tutor do animal de estimação.



O tratamento de primeira escolha para OA.



## AGE DE UM MODO DIFERENTE

É um AINE não inibidor das cicloxigenases.

Que bloqueia especificamente o receptor EP4 da PGE<sub>2</sub>.


Para o tratamento da dor e da inflamação em cães com OA.

### OA Canina

A OA canina é caracterizada pela inflamação intermitente e pela degeneração da cartilagem, levando à dor crônica e progressiva e a alterações na mobilidade.

### Mediando a Dor e a Inflamação da OA<sup>5</sup>


O receptor EP4 é o mediador primário da sensibilização induzida por PGE<sub>2</sub> dos neurônios sensoriais e da inflamação induzida por PGE<sub>2</sub>. A ativação do receptor EP4 por PGE<sub>2</sub> leva à sensibilização dos neurônios sensoriais e à inflamação.



ALÍVIO DA DOR NA OA CANINA - PENSE A RESPEITO.

### Um Modo de Ação Diferente de Todos os Outros AINES

Galliprant™ trata a dor e a inflamação induzidas pela PGE<sub>2</sub> ao antagonizar seletivamente o receptor EP4, reduzindo a gravidade da dor e o quanto a dor pode interferir nas atividades diárias.



### Melhora da Dor e da Funcionalidade

Ao avaliar a eficácia de Galliprant™ em cães com dor relacionada à OA, os tutores de animais de estimação forneceram um *feedback* utilizando o Breve Questionário da Dor Canina (CBPI). O CBPI possibilitou que os tutores dos animais classificassem a gravidade da dor do cão e o quanto a dor interferia nas funções e atividades diárias.


O CBPI é um dos questionários mais amplamente validados para tutores de animais de estimação



Gravidade da dor



Atividades em geral



Diversão



Capacidade de subir escadas



Capacidade de se levantar



Capacidade de caminhar



Capacidade de correr

Galliprant™ pode ajudar você a proporcionar alívio diário da dor da OA canina. Informações mais detalhadas sobre o estudo principal são fornecidas na próxima página.



**ALÍVIO COMPROVADO NA DOR  
PROVENIENTE DA OA COM**

**Galliprant™**  
(grapiprant)



### Avaliações Realizadas por Tutores de Animais de Estimação e Médicos Veterinários


262 cães de clientes da clínica, tratados de acordo com o protocolo para OA de ocorrência natural.



### Maior Sucesso do Tratamento com Galliprant™

Cães avaliados quanto à melhora da dor e da funcionalidade utilizando o Breve Questionário da Dor Canina (CBPI).

#### Sucesso do Tratamento<sup>6</sup>



<sup>†</sup>Variável de eficácia primária = pontuação no CBPI no D28 em comparação ao D0 (critérios de falha no sucesso do tratamento).

**Maior sucesso do tratamento em comparação ao placebo observado durante a primeira semana de tratamento, e as melhoras continuaram durante todo o período do estudo.**

Os cães precisavam apresentar pontuação de gravidade da dor no CBPI  $\geq 2$  e pontuação de interferência da dor  $\geq 2$  para inclusão. O sucesso do tratamento utilizando o CBPI é definido como melhora na pontuação de gravidade da dor de 2 ou mais E melhora na pontuação de interferência da dor de 1 ou mais E a avaliação global deveria ser a mesma ou melhor.

### Dois grupos (131 cães por grupo) com sinais radiográficos e clínicos de OA leve, moderada e grave

#### Galliprant™

2 mg/kg v.o.  
uma vez ao  
dia por 28 dias

#### Cães tratados:

- 2 a 16,75 anos de idade
- 4 a 59 kg

#### Equivalente ao placebo

Uma vez ao dia por 28 dias


- ✓ PROSPECTIVO
- ✓ RANDOMIZADO
- ✓ CEGO

### Melhoras significativas na dor e funcionalidade avaliadas pelo dono do animal


Houve melhora mais evidente e estatisticamente significativa<sup>††</sup> maior (redução na **gravidade da dor E na interferência da dor**) nos dias **7, 14, 21 e 28 com Galliprant™**.

- ✓ D7
- ✓ D14
- ✓ D21
- ✓ D28

#### Pontuação de Gravidade da Dor<sup>6</sup>



#### Pontuação de Interferência da Dor<sup>6</sup>



Comparação das pontuações no v (alteração percentual média desde o Dia 0) entre os grupos. <sup>††</sup>P < 0,05 em todos os intervalos.

**ALÍVIO COMPROVADO NA DOR  
PROVENIENTE DA OA COM**

**Galliprant™**  
(grapiprant)



**Recomendado com Segurança**

Cães avaliados na clínica quanto à eficácia utilizando a Pontuação Ortopédica Total (TOS).


Pontuação Ortopédica Total = Soma das pontuações para 7 componentes

Faixa de pontuação em cada componente: 0 = normal a 4 = gravemente afetado.			Dor/ resistência mediante palpação
	Suporta peso		Anormalidade na extensão (RoM)
	Levanta a pata (contralateral)		Edema
	Claudicação (caminhada)		Claudicação (trote)

**Melhoras Significativas na Dor e Funcionalidade Avaliadas pelo Veterinário**

Melhora superior nas Pontuações Ortopédicas Totais (TOS) com Galliprant™ em comparação ao placebo (estatisticamente significativa\*), tanto no dia 14 quanto no dia 28 (D14: P = 0,0029; D28: P = 0,0086).<sup>6</sup>

**Pontuações Ortopédicas Totais**



Comparação das pontuações TOS médias entre os grupos. \*P< 0,01 nos dois intervalos; um valor de TOS mais baixo é melhor.



**Tratamento EFICAZ**  
da dor e da inflamação  
associados à OA  
em cães.

USE COMO TRATAMENTO DE PRIMEIRA ESCOLHA



Trate a dor e a inflamação da OA canina DESDE OS ESTÁGIOS INICIAIS e utilize o medicamento pelo período que for necessário\*\*

Galliprant™ é um AINE que age de modo diferente para o tratamento da dor e da inflamação associados à osteoartrite em cães.

**PARA TODOS OS ESTÁGIOS** da OA, desde os sinais clínicos iniciais.\*

**SEGURO** para uso diário.




*"Eu me sinto tranquila em escolher Galliprant™ como opção de primeira escolha para meus casos de OA"*

**Kristin Kirkby Shaw**

DVM, MS, PhD, DACVS, CCRT, DACVASM

\*Aprovado para uso em cães com mais de 9 meses de idade e acima de 3,6 kg.  
‡O monitoramento é recomendado para uso em longo prazo.



Reduz o impacto nas funções homeostáticas mediadas por outros receptores.

Bloqueia o mediador primário da dor e inflamação da OA.

Galliprant™ é o **PRIMEIRO MEDICAMENTO DA CLASSE** de AINE não inibidor da COX.

Atua **ESPECIFICAMENTE** no receptor EP4 da prostaglandina E2.








Seu modo de ação **ATUA NA DOR E NA INFLAMAÇÃO DA OA CANINA**, enquanto reduz o impacto no trato GI, nos rins e na homeostase do fígado.<sup>5,7‡</sup>



## REALIZE O TRATAMENTO COM GALLIPRANT™ DESDE OS ESTÁGIOS INICIAIS DA OA CANINA E PELO PERÍODO QUE FOR NECESSÁRIO\*\*

As imagens dos comprimidos não correspondem ao tamanho real.

Dose	Peso (kg)	Comprimido de 20 mg	Comprimido de 60 mg	Comprimido de 100 mg
2 mg/kg uma vez ao dia	3,6-6,8		--	--
	6,9-13,6		--	--
	13,7-20,4	--		--
	20,5-34	--		--
	34,1-68	--	--	

**ENTRE EM CONTATO COM O SEU REPRESENTANTE ELANCO PARA INCORPORAR GALLIPRANT™ EM SEU PROTOCOLO DE DOR DA OA HOJE**

Para mais informações, acesse:  
[www.elanco.com.br/produtos/pets/galliprant](http://www.elanco.com.br/produtos/pets/galliprant)

1. Elanco. Dados em arquivo. 2. Lascelles D. International Association for the Study of Pain, 2016, Fact Sheet No. 9. 3. Cachon T, et al. Vet J. 2018 May 1;235:1-8. 4. Innes J, et al. Vet Record 2010;166:226-230 5. Kirkby Shaw K, et al. Vet Med Sci. 2016;2:3-9. 6. Rausch-Derra L, et al. J Vet Intern Med. 2016;30:756-763. 7. Rausch-Derra L, et al. Am J Vet Res. 2015;76(10):853-859.

\*Aprovado para uso em cães com mais de 9 meses de idade e acima de 3,6 kg.

†O monitoramento é recomendado se utilizado em longo prazo.

Galliprant™, Elanco e o logotipo de barras diagonais são marcas registradas da Elanco ou de suas filiais. Todos os direitos reservados. Mar/2021. PM-BR-21-0169

